

生活中每一刻都很重要

在治療慢性乙肝的同時繼續享受與親人共度的時光



問問醫生是否該開始服用 VEMLIDY

VEMLIDY 是一種用於為穩定(代償性)肝病成年患者治療慢性(持久性)乙型肝炎(乙肝)病毒的處方藥。

 **Vemlidy**[®]
tenofovir alafenamide 25mg tablets

[點擊此處](#)獲取有關 VEMLIDY 的**重要事實**及有關**乙肝感染惡化**的**重要警告**。

與親朋好友共度的每一刻都非常珍貴。

什麼是 VEMLIDY?

VEMLIDY 是一種用於為穩定(代償性)肝病成年患者治療慢性(持久性)乙肝病毒的處方藥。

- VEMLIDY 可降低體內乙肝病毒含量。
- VEMLIDY 可改善肝臟狀況。

VEMLIDY 有何重要須知?

VEMLIDY 可能引起嚴重的副作用,包括:

• 乙肝病毒感染惡化。

如在服用 VEMLIDY 後停用, 乙肝病毒感染可能變得更糟(即嚴重急性惡化)。「嚴重急性惡化」的意思就是, 乙肝病毒感染又突然重新發作, 而且比以前更糟。切勿停用 VEMLIDY, 一定要先問醫生, 因為需要定期監查健康, 檢查肝臟。

美國食品藥品監督管理局 (FDA) 核准時間表

慢性乙肝口服抗病毒治療藥物時間表如下

- **1998 年 LAM** (lamivudine)
- **2002 年 ADV** (adefovir dipivoxil)
- **2005 年 ETV** (entecavir)
- **2006 年 LdT** (telbivudine)
- **2008 年 TDF**
(tenofovir disoproxil fumarate)
- **2016 年 VEMLIDY** (tenofovir alafenamide)

這個時間表無意比較上列藥物的療效或安全性。



演員形象。

點擊此處獲取有關 VEMLIDY 的重要事實, 包括**重要警告**。

Vemlidy[®]
tenofovir alafenamide 25mg
tablets

了解慢性乙肝

肝臟有什麼功能？

肝臟是身體最重要的部分之一，每天都在做很多有益之事，包括：



抗擊感染



幫助消化食物



儲存能量和營養



去除血液中的有害物質

什麼是慢性乙肝？

慢性乙肝是一種由乙肝病毒長期感染引起的疾病，隨著時間的推移，可能導致嚴重的肝臟損傷，例如，纖維化（疤痕）或肝癌。

病毒載量越高，肝臟損傷的風險就越高。



切記：觸摸、接吻、飲酒、食物、飲水、空氣或共用杯子和餐具都不可能感染乙肝。

慢性乙肝如何損傷肝臟

不治的時間越長，乙肝造成的損害就越大。

慢性乙肝可導致：



發炎

隨著時間的推移，可能造成疤痕的肝臟腫脹



纖維化

疤痕組織取代健康組織的肝臟疤痕



肝硬化

可能影響肝臟功能的嚴重結疤



肝癌


也稱肝細胞癌或 HCC

醫生可能要求做監查 慢性乙肝的常用檢查，包括：



病毒載量檢查

測量體內乙肝病毒含量



ALT 檢查

顯示是否有活動性肝損傷



肝癌篩檢

用肝臟超音波影像和/或驗血查看是否有癌細胞

ALT = 丙氨酸氨基轉移酶。

慢性乙肝感染症狀

如覺以下任何症狀，不要忽視，
務必馬上告訴醫生。



疲倦/疲憊



發燒



關節痛



胃痛



噁心和嘔吐



食慾不振



眼睛或皮膚發黃
(俗稱黃疸病)



淺色大便或
深色尿液



許多慢性乙肝患者都可能沒有任何症狀。
由於可能嚴重損傷肝臟，即使感覺良好，
也務必定期就醫。

無論治療之旅處於什麼階段，**積極管理**乙肝
都至關重要。**務必定期就醫監查**乙肝。

抗病毒治療目標



減少體內乙肝病毒含量



減少對肝臟的損害



減少得嚴重肝病的機會，
例如，肝硬化和肝癌

**治療慢性乙肝對於
減少健康問題非常重要**

如有慢性乙肝，與未感染者相比，就更可能出現
其他健康問題。

一些常見健康問題包括：

- 慢性腎病
- 高血壓
- 糖尿病
- 骨骼脆弱
- 肝癌

**乙肝是一種慢性病，
大多數患者都需長期服藥。**

從開始到 8 年 (第 384 週) 追蹤 VEMLIDY 試驗參與者

截至 2024 年 4 月 25 日, 110 試驗是最大且有良好對照的慢性乙肝治療試驗之一, 共有 873 名患者參與。

- 108 試驗 (425 名患者) 和 110 試驗 (873 名患者) 研究了 VEMLIDY (每天 25 毫克) 對有穩定肝病的慢性乙肝患者與富馬酸替諾福韋二吡啶酯 (惠立妥 (TDF), 每天 300 毫克) 相比的療效和安全性



在不同患者群體中 對 VEMLIDY 進行了研究

108 試驗和 110 試驗包括亞裔、黑人或非裔美國人、夏威夷原住民、太平洋島民或白人患者

- 患者年齡 18-80 歲
- 63% 男性, 37% 女性
- 75% 的患者之前未接受過乙肝治療

VEMLIDY 常見副作用

在每個人參與試驗至少 2 年 (約 96 週) 時, 對結果進行了分析, 那時的常見副作用*包括:

	VEMLIDY (866 名患者)	惠立妥 (432 名患者)
頭痛	12%	10%
胃部不適†	9%	6%
咳嗽	8%	8%
背疼	6%	6%
疲憊	6%	5%
噁心	6%	6%
關節痛	5%	6%
腹瀉	5%	5%
消化不良	5%	5%

*常見副作用包括至少 5% 服用 VEMLIDY 研究參與者報告的任何副作用。

†胃部不適可能意味著腹部或胃腸道疼痛或不適。

點擊此處獲取有關 VEMLIDY 的重要事實, 包括**重要警告**。

已證明 VEMLIDY 能:



能減少體內乙肝病毒含量 (病毒載量)

研究發現, 經過 48 週治療後, 使用 VEMLIDY 降低體內乙肝病毒量 (DNA) 與惠立妥**一樣有效**:

108 試驗

VEMLIDY

(285 名患者中 268 名)

94%

惠立妥

(140 名患者中 130 名)

93%

110 試驗

VEMLIDY

(581 名患者中 371 名)

64%

惠立妥

(292 名患者中 195 名)

67%

- 108 試驗第 96 週乙肝病毒量有所降低: VEMLIDY 90% (285 名患者中 257 名), 惠立妥 91% (140 名患者中 127 名)
- 110 試驗第 96 週乙肝病毒量有所降低: VEMLIDY 73% (581 名患者中 423 名), 惠立妥 75% (292 名患者中 218 名)



改善了肝臟化驗值

丙氨酸氨基轉移酶 (ALT) 是肝損傷的衡量標準。這兩項試驗也探討了治療是否有助於 ALT 含量恢復正常, 並發現**更多患者**在使用 VEMLIDY 48 週後**顯示正常含量**:

108 試驗

VEMLIDY

(276 名患者中 137 名)

50%

惠立妥

(138 名患者中 44 名)

32%

110 試驗

VEMLIDY

(572 名患者中 257 名)

45%

惠立妥

(290 名患者中 105 名)

36%

- 在第 96 週, 108 試驗的 ALT 正常化: VEMLIDY 50% (276 名患者中 139 名), 惠立妥 40% (138 名患者中 55 名)
- 在第 96 週, 110 試驗的 ALT 正常化: VEMLIDY 52% (572 名患者中 299 名), 惠立妥 42% (290 名患者中 121 名)

欲詳知截至第 384 週其他數據點, 請問醫生。



VEMLIDY 有何潛在副作用？

- **新的或更糟的腎臟問題，包括腎衰竭。**

在用 VEMLIDY 開始治療之前和期間，醫生應驗血驗尿檢查腎臟。如有新的或更糟的腎臟問題，醫生或會告知停用 VEMLIDY。

- **血液中乳酸過多(乳酸性酸中毒)**，這是一種罕見的嚴重醫療緊急情況，可能導致死亡。如有這些症狀，請馬上告訴醫生：無力或比平常更累，異常肌肉疼痛，呼吸短促或急促，伴有噁心和嘔吐的胃痛，感冒或手腳變藍，感到暈眩或頭暈，或心跳快速或異常。

- **非常嚴重的肝臟問題**，極少數情況下可能導致死亡。如有這些症狀，請馬上告訴醫生：皮膚或眼白變黃，深色的「茶色」尿液，淺色大便，食慾不振數天或更長時間，噁心或胃痛。



VEMLIDY 最常見的副作用是頭痛。這些並非 VEMLIDY 所有的潛在副作用。如有任何副作用，感到不適或不消失，請告訴醫生。

在服用 VEMLIDY 之前，應告訴醫生什麼？



所有病症，包括是否有終末期腎病(ESRD)或愛滋病病毒 1 型 (HIV-1) 感染。在開始服用 VEMLIDY 之前，醫生可查是否感染了愛滋病病毒。如有愛滋病病毒並只服用 VEMLIDY，愛滋病病毒可能會產生抗藥性，變得更難治療。



如已懷孕或計劃懷孕。目前尚不知道 VEMLIDY 是否會傷害未出生的寶寶。如在使用 VEMLIDY 治療期間懷孕，請告訴醫生。



如果正在哺乳或計劃哺乳。VEMLIDY 可能進入母乳。請就醫詢問餵養寶寶的最佳方法。



所有現用藥物，包括處方藥和非處方藥、維他命和草藥補充劑。一些藥物可能影響 VEMLIDY 的作用。請記下所有現用藥物，拿給醫生和藥劑師看。



開始服用新藥之前，務必先告訴醫生。

詢問醫生，與所有其他藥物一起服用 VEMLIDY 是否安全。

VEMLIDY 的安全性已經過長期臨床試驗研究， 對骨骼和腎臟健康的影響已廣為人知。

骨骼安全


VEMLIDY 對骨骼健康的 影響小於惠立妥

在 108 試驗和 110 試驗中，VEMLIDY 對骨礦物質密度的影響小於惠立妥。

骨礦物質密度(BMD)是骨骼健康的良好衡量標準和指標。在 108 試驗和 110 試驗中，與服用惠立妥的患者相比，服用 VEMLIDY 患者的骨骼健康影響更小，且能更好地維持骨礦物質密度。

骨骼健康很重要，大多數人的骨骼在 30 多歲時仍在繼續生長。無論骨骼仍在生長還是更多在保持強度，VEMLIDY 都與惠立妥一樣有效，而且對骨骼健康的影響更小。

與惠立妥相比，VEMLIDY 在約 2 年(96 週) 時對骨礦物質密度的影響更小：



負數越大表示骨礦物質密度下降幅度越大。

骨礦物質密度是骨骼健康的關鍵指標。在研究參與者進入研究時及研究開始後約 2 年再次測量了骨礦物質密度。

這些變化對骨礦物質密度的長期意義尚不清楚。

eGFR = 估算腎絲球過濾率。

點擊此處獲取有關 VEMLIDY 的重要事實，包括**重要警告**。

腎臟安全

VEMLIDY 對腎臟健康的 影響小於惠立妥

在 108 試驗和 110 試驗某些腎臟化驗中，服用 VEMLIDY 患者的影響小於服用惠立妥的患者。

根據化驗測量，服用 VEMLIDY 患者的腎功能維持比服用惠立妥的患者更好。

腎臟清除血液中的廢物，有助於保持健康，因此務必好好照護。VEMLIDY 與惠立妥一樣有效，對腎臟的影響更小。

- **VEMLIDY 可能會導致新的或惡化的腎臟問題，包括腎衰竭。** 在用 VEMLIDY 開始治療之前和期間，醫生應驗血驗尿檢查腎臟。
- 如有新的或更糟的腎臟問題，醫生或會告知停用 VEMLIDY。

與惠立妥相比，VEMLIDY 在約 2 年(96 週) 時對腎功能化驗值的影響更小：



負數越大表示腎功能下降越嚴重。

eGFR 是醫生可用來了解腎臟功能狀況的測量之一。在研究參與者進入研究時及研究開始後約 2 年後再次測量了 eGFR。

這些變化對腎臟副作用頻率的長期意義尚不清楚。

每天方便的相同劑量 VEMLIDY

VEMLIDY 是一粒小*藥片，可在一天中任何時間隨餐服用，無需複雜的時間表。



圖片顯示並非藥片實物大小
(*直徑 8 毫米)



必須完全按醫囑服用 VEMLIDY。



如在接受透析，在透析日應在透析後服用 VEMLIDY。一定要按定期劑量時間表服用 VEMLIDY，以免錯過劑量。



除非有醫囑，否則不要停用 VEMLIDY。如果停用藥物，乙肝病毒感染可能會變得更糟 (即嚴重急性惡化)。「嚴重急性惡化」的意思就是，乙肝病毒感染又突然重新發作，而且比以前更糟。



在藥物用完之前，請務必及時續藥。在 VEMLIDY 所剩無幾時，向醫生或藥房多要，以助確保不錯過任何劑量，並可避免引起嚴重急性惡化。



如果服用 VEMLIDY 過量，請致電醫生，或馬上前往最近的醫院急診室。

點擊此處獲取有關 VEMLIDY 的重要事實，包括**重要警告**。

擔心費用嗎？

最低

\$0*
共付額

您可能符合資格參加 VEMLIDY 共付額優惠券計劃。

VEMLIDY 共付額優惠券計劃可助降低自付費用。

- 每年節省自付費用高達 6,000 美元
- 沒有月度限額
- 適用於有商業保險的合格患者



可提供中文翻譯服務。

請馬上致電 **1-877-627-0415** 開始。

*具體條款與細則請見 mysupportpath.com

即使沒有資格參加 VEMLIDY 共付額優惠券計劃，援助途徑 (Support Path®) 也可協助

- 您是否需助了解自己的健康保險和 Gilead 的藥費？
- 即使不符合共付額優惠券計劃資格，也可撥打下列電話號碼致電援助途徑 (Support Path)，了解其他治療和保險費用相助財務資源。



欲詳細了解，請致電

1-855-7-MYPATH (1-855-769-7284)

辦公時間：週一至週五，上午 9 點至晚上 8 點 (東部時間)

點擊此處

欲詳知資格和註冊方法，請造訪 www.vemlidy.com/savings

Vemlidy®
tenofovir alafenamide 25mg tablets

VEMLIDY 是一種用於為穩定(代償性)肝病成年患者治療慢性持久性乙型肝炎(乙肝)病毒的處方藥。

VEMLIDY 可能引起嚴重的副作用,包括:

- **乙肝病毒感染惡化。**

如在服用 VEMLIDY 後停用, 乙肝病毒感染可能變得更糟(即嚴重急性惡化)。「嚴重急性惡化」的意思就是, 乙肝病毒感染又突然重新發作, 而且比以前更糟。切勿停用 VEMLIDY, 一定要先問醫生, 因為需要定期監查健康, 檢查肝臟。

接下來該做什麼?

無論是已有處方, 還是剛開始考慮治療,
務必知道接下來該做什麼。



定期監查乙肝



詢問醫生 VEMLIDY
是否適合您



按醫囑服用
VEMLIDY



請造訪以下連結,
聆聽患者故事,
詳細了解乙肝

[點擊此處](#)

觀看類似患者的
有用視訊

[點擊此處](#)

觀看其他資源

[點擊此處](#)獲取有關 VEMLIDY 的**重要事實**及有關**乙肝感染惡化**的**重要警告**。

VEMLIDY、VEMLIDY Logo、SUPPORT PATH、GILEAD 和 GILEAD Logo 是 Gilead Sciences, Inc. 及其關聯公司的商標。
©2024 年 Gilead Sciences, Inc. 版權所有。保留所有權利。US-VMC-0057 2024 年 9 月

