Những khoảnh khắc mới quan trọng

Tiếp tục tận hưởng những khoảnh khắc bên những người thân yêu, trong khi điều trị bệnh viêm gan B mãn tính

Diễn viên miêu tả.

Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị ngay hôm nay về việc bắt đầu VEMLIDY

VEMLIDY là một loại thuốc theo toa, dùng để điều trị siêu vi viêm gan B (HBV) mãn tính (lâu dài) ở những người lớn mắc bệnh gan ổn định (còn bù)

Vemlidy®
tenofovir alafenamide 25mg tablets

Nhấp vào đây để xem Các Dữ Kiện Quan Trọng về VEMLIDY, cùng với **các cảnh báo quan trọng** về **tình trạng trầm trọng hơn của chứng viêm gan B**.

Mỗi giây phút bên gia đình và bạn bè của quý vị đều quý giá

VEMLIDY là gì?

VEMLIDY là một loại thuốc theo toa, dùng để điều trị siêu vi viêm gan B (HBV) mãn tính (lâu dài) ở những người lớn mắc bệnh gan ổn định (còn bù).

- VEMLIDY có thể làm giảm lượng HBV trong cơ thể của quý vị
- VEMLIDY có thể cải thiện tình trạng lá gan của quý vị

Tôi nên biết những thông tin quan trọng nào về VEMLIDY?

VEMLIDY có thể gây ra các phản ứng phụ nghiêm trọng, trong đó bao gồm:

- **Chứng nhiễm siêu vi viêm gan B (HBV) trầm trọng hơn.**
  Chứng nhiễm HBV của quý vị có thể trở nên trầm trọng hơn (đợt tiến triển cấp nặng) nếu quý vị dùng VEMLIDY và sau đó ngừng dùng thuốc này. "Đợt tiến triển cấp nặng" là khi chứng nhiễm HBV của quý vị đột ngột quay lại trầm trọng hơn trước đây. Đừng ngừng dùng VEMLIDY khi chưa nói chuyện trước với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị, vì họ sẽ cần giám sát sức khỏe của quý vị thường xuyên để kiểm tra lá gan của quý vị.

Khung thời gian cho Các Phê Chuẩn của FDA

Dưới đây là khung thời gian của các phương pháp điều trị kháng siêu vi đường uống cho bệnh viêm gan B mãn tính

- **1998 LAM** (lamivudine)
- **2002 ADV** (adefovir dipivoxil)
- **2005 ETV** (entecavir)
- **2006 LdT** (telbivudine)
- **2008 TDF** (tenofovir disoproxil fumarate)
- **2016 VEMLIDY** (tenofovir alafenamide)

Khung thời gian này không nhằm mục đích so sánh công hiệu hoặc độ an toàn của các loại thuốc ghi trên.

Diễn viên miêu tả.

Nhấp vào đây để xem Các Dữ Kiện Quan Trọng về VEMLIDY, bao gồm cả **các cảnh báo quan trọng**.

Vemlidy® tenofovir alafenamide 25mg tablets

Hiểu về bệnh viêm gan B mãn tính

Lá gan có chức năng gì?

Lá gan là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể. Lá gan làm rất nhiều việc hữu ích cho quý vị hàng ngày, trong đó bao gồm:

Chống nhiễm trùng

Giúp tiêu hóa thức ăn

Tích trữ năng lượng và các chất dinh dưỡng

Loại thải các chất độc hại ra khỏi dòng máu

Bệnh viêm gan B mãn tính là gì?

Bệnh viêm gan B mãn tính là một căn bệnh do tình trạng nhiễm siêu vi viêm gan B lâu dài gây ra. Theo thời gian, nó có thể dẫn đến tổn thương gan nghiêm trọng, chẳng hạn như chai gan (sẹo) hoặc ung thư gan.

Lượng siêu vi càng cao, thì nguy cơ quý vị bị tổn thương lá gan càng lớn.

Quan trọng là cần biết rằng quý vị không thể mắc bệnh viêm gan B do đụng chạm, hôn, uống rượu, thực phẩm, nước, không khí, hoặc dùng chung ly chén và dao muỗng nĩa.

Bệnh viêm gan B mãn tính có thể làm tổn hại lá gan như thế nào

Bệnh viêm gan B của quý vị càng để lâu không được điều trị, thì mức độ tổn hại do nó gây ra càng lớn.

Bệnh viêm gan B mãn tính có thể dẫn đến:

Sưng viêm
Tình trạng sưng lá gan có thể dần dần gây sẹo

Xơ gan
Tình trạng sẹo lá gan nơi mô sẹo thay thế mô khỏe mạnh

Chai gan
Tình trạng tạo sẹo rất nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của lá gan

Ung thư gan
Cũng còn được gọi là ung thư biểu mô tế bào gan, hay HCC

Các xét nghiệm phổ biến mà nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể yêu cầu để theo dõi bệnh viêm gan B mãn tính bao gồm:

Xét Nghiệm Kiểm Tra Lượng Vi-rút
Đo mức siêu vi bệnh viêm gan B trong cơ thể của quý vị



Xét Nghiệm ALT
Cho biết quý vị hiện đang có tình trạng tổn thương gan hay không



Xét Nghiệm Dò Tìm Ung Thư Gan
Sử dụng hình ảnh siêu âm lá gan của quý vị và/hoặc xét nghiệm máu để xem có bất kỳ tế bào ung thư nào hay không

ALT=alanine aminotransferase.

Các triệu chứng của chứng nhiễm viêm gan B mãn tính

Nếu quý vị cảm thấy bất kỳ triệu chứng nào sau đây, đừng bỏ qua chúng và bảo đảm cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị biết ngay.

Mệt/mệt mỏi

Sốt

Đau khớp

Đau vùng bao tử

Buồn nôn và ói mửa

Chán ăn

Vàng da hoặc mắt (hay còn gọi là chứng vàng da)

Phân có màu nhạt hoặc nước tiểu sậm màu

Nhiều bệnh nhân mắc bệnh viêm gan B mãn tính không gặp bất kỳ triệu chứng nào. Vì nguy cơ gây tổn thương gan nghiêm trọng, quan trọng là cần gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị thường xuyên, ngay cả khi quý vị cảm thấy khỏe mạnh bình thường.

*Bất kể quý vị ở đâu trong hành trình bệnh viêm gan B của quý vị, **việc tích cực kiểm soát** bệnh viêm gan B mãn tính của quý vị là vô cùng quan trọng. **Bảo đảm tới gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị thường xuyên để theo dõi bệnh viêm gan B của quý vị.***

Các mục tiêu của liệu pháp kháng siêu vi

Giảm lượng **siêu vi viêm gan B trong cơ thể quý vị**

Giảm bớt hư hại cho lá gan

Giảm nguy cơ mắc **các bệnh gan nghiêm trọng, chẳng hạn như chai gan và ung thư gan**

Điều trị bệnh viêm gan B mãn tính là quan trọng để giảm các vấn đề sức khỏe

Nếu quý vị có bệnh viêm gan B mãn tính, quý vị có thể có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe khác cao hơn so với những người không bị nhiễm bệnh.

Một số vấn đề sức khỏe thường gặp bao gồm:

- Bệnh thận mãn tính
- Huyết áp cao
- Tiểu đường
- Xương yếu
- Ung thư gan

Đa số bệnh nhân sẽ cần dùng thuốc trong thời gian dài vì bệnh viêm gan B là bệnh mãn tính

Những người tham gia thử nghiệm VEMLIDY được theo dõi từ khi bắt đầu cho đến hết 8 năm (Tuần 384)

Tính đến ngày 25 tháng Tư năm 2024, Thử Nghiệm 110 là một trong những cuộc nghiên cứu điều trị lớn nhất, được kiểm soát tốt về bệnh viêm gan B mãn tính, với 873 bệnh nhân

- Thử Nghiệm 108 (425 bệnh nhân) và 110 (873 bệnh nhân) đã nghiên cứu công hiệu và độ an toàn của VEMLIDY (25 mg mỗi ngày) đối với các bệnh nhân có siêu vi viêm gan B mãn tính với bệnh gan ổn định so với tenofovir disoproxil fumarate (TDF, 300 mg mỗi ngày)

VEMLIDY đã được nghiên cứu ở một nhóm bệnh nhân đa dạng

Thử Nghiệm 108 và 110 bao gồm các bệnh nhân là người Á châu, người Da đen hoặc người Mỹ gốc Phi châu, thổ dân Hawaii, người Đảo Thái Bình Dương, hoặc người Da trắng

- Bệnh nhân từ 18 đến 80 tuổi
- 63% là nam, 37% là nữ
- 75% bệnh nhân chưa được điều trị HBV trước đó

Các tác dụng phụ thường gặp của VEMLIDY

Kết quả được phân tích khi tất cả mọi người đã tham gia cuộc nghiên cứu trong ít nhất 2 năm (~96 tuần). Vào thời điểm đó, các tác dụng phụ thường gặp* bao gồm:

	VEMLIDY (866 bệnh nhân)	TDF (432 bệnh nhân)
Đau đầu	12%	10%
Khó chịu trong bao tử†	9%	6%
Ho	8%	8%
Đau lưng	6%	6%
Mệt mỏi	6%	5%
Buồn nôn	6%	6%
Đau khớp (đau khớp)	5%	6%
Tiêu chảy	5%	5%
Chứng khó tiêu (khó tiêu)	5%	5%

*Các tác dụng phụ thường gặp bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào được báo cáo ở ít nhất 5% số người tham gia nghiên cứu dùng VEMLIDY.
†Khó chịu ở bao tử có thể có nghĩa là khó chịu hoặc đau ở bụng hoặc đường tiêu hóa.

Nhấp vào đây để xem Các Dữ Kiện Quan Trọng về VEMLIDY, bao gồm cả **các cảnh báo quan trọng**.

VEMLIDY đã được cho thấy là:

Làm giảm lượng bệnh viêm gan B ở các bệnh nhân (lượng siêu vi)

VEMLIDY được thấy là **có hiệu quả tương đương** với TDF trong việc giảm mức HBV DNA trong cơ thể sau 48 tuần điều trị:

Thử Nghiệm 108		Thử Nghiệm 110	
VEMLIDY (268 trong số 285 bệnh nhân)	**TDF** (130 trong số 140 bệnh nhân)	**VEMLIDY** (371 trong số 581 bệnh nhân)	**TDF** (195 trong số 292 bệnh nhân)
94%	**93%**	**64%**	**67%**

- Thử Nghiệm 108 giảm HBV DNA ở Tuần 96: VEMLIDY 90% (257 trong số 285 bệnh nhân), TDF 91% (127 trong số 140 bệnh nhân)
- Thử Nghiệm 110 giảm HBV DNA ở Tuần 96: VEMLIDY 73% (423 trong số 581 bệnh nhân), TDF 75% (218 trong số 292 bệnh nhân)

Cải thiện các giá trị xét nghiệm liên quan đến gan

ALT là thước đo tổn thương gan. Các cuộc thử nghiệm cũng xem xét liệu việc điều trị có giúp các mức ALT trở lại bình thường hay không và thấy rằng **nhiều bệnh nhân hơn đã cho thấy tình trạng bình thường hóa khi dùng VEMLIDY** sau 48 tuần:

Thử Nghiệm 108		Thử Nghiệm 110	
VEMLIDY (137 trong số 276 bệnh nhân)	**TDF** (44 trong số 138 bệnh nhân)	**VEMLIDY** (257 trong số 572 bệnh nhân)	**TDF** (105 trong số 290 bệnh nhân)
50%	**32%**	**45%**	**36%**

- Thử Nghiệm 108 bình thường hóa ALT ở Tuần 96: VEMLIDY 50% (139 trong số 276 bệnh nhân), TDF 40% (55 trong số 138 bệnh nhân)
- Thử Nghiệm 110 bình thường hóa ALT ở Tuần 96: VEMLIDY 52% (299 trong số 572 bệnh nhân), TDF 42% (121 trong số 290 bệnh nhân)

Để biết chi tiết về các điểm dữ liệu bổ sung cho đến tối đa Tuần 384, vui lòng nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Vemlidy® tenofovir alafenamide 25mg tablets

VEMLIDY có thể gây ra những phản ứng phụ nào?

- **Các vấn đề về thận mới xuất hiện hoặc trầm trọng hơn, bao gồm cả suy thận**. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị sẽ làm các xét nghiệm máu và nước tiểu để kiểm tra thận của quý vị khi bắt đầu và trong khi điều trị bằng VEMLIDY. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể đề nghị quý vị ngừng dùng VEMLIDY nếu quý vị có các vấn đề mới hoặc trầm trọng hơn về thận.
- **Quá nhiều a-xít lactic trong máu (nhiễm a-xít lactic)**, là trường hợp cấp cứu y khoa nghiêm trọng nhưng hiếm gặp, có thể gây tử vong. Cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị biết ngay nếu quý vị có các triệu chứng sau đây: suy nhược hoặc mệt mỏi hơn bình thường, đau cơ bất thường, thở dốc hoặc thở nhanh, đau bụng cùng với triệu chứng buồn nôn và ói mửa, bàn tay và bàn chân lạnh hoặc tái xám, cảm giác chóng váng hoặc đau đầu, hoặc nhịp tim đập nhanh hoặc bất thường.
- **Các vấn đề rất nghiêm trọng về gan**, trong những trường hợp hiếm gặp có thể gây tử vong. Cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị biết ngay nếu quý vị gặp các triệu chứng sau đây: da hoặc lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng, nước tiểu sậm màu "như màu nước trà", phân nhạt màu, chán ăn trong vài ngày hoặc lâu hơn, buồn nôn, hoặc đau vùng bao tử.

Phản ứng phụ thường gặp nhất của VEMLIDY là đau đầu. Đây không phải là tất cả các phản ứng phụ có thể gặp khi dùng VEMLIDY. Cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị biết nếu quý vị có bất kỳ phản ứng phụ nào gây phiền toái cho quý vị hoặc không hết.

Tôi cần cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của tôi biết những gì trước khi dùng VEMLIDY?

Toàn bộ các bệnh trạng của quý vị, trong đó bao gồm quý vị có đang mắc bệnh thận giai đoạn cuối (ESRD) hoặc nhiễm HIV-1 hay không. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể cho quý vị làm xét nghiệm kiểm tra tình trạng nhiễm HIV trước khi bắt đầu dùng VEMLIDY. Nếu quý vị có HIV và chỉ dùng VEMLIDY, siêu vi HIV có thể trở nên kháng thuốc và khó điều trị hơn.

Nếu quý vị đang mang thai hoặc dự định có thai. Hiện chưa biết VEMLIDY có gây hại cho thai nhi của quý vị hay không. Cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị biết nếu quý vị có thai trong thời gian điều trị bằng VEMLIDY.

Nếu quý vị đang cho con bú sữa mẹ hoặc dự định cho con bú sữa mẹ. VEMLIDY có thể lọt vào trong sữa mẹ của quý vị. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị về cách tốt nhất để cho con quý vị ăn.

Tất cả các loại thuốc mà quý vị dùng, kể cả thuốc kê toa và thuốc mua không cần toa, các loại sinh tố, và thuốc bổ thảo dược. Một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến công dụng của VEMLIDY. Giữ một danh sách tất cả các loại thuốc của quý vị và cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dược sĩ của quý vị xem danh sách này.

Đừng bắt đầu dùng thuốc mới khi chưa nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị. Hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị để biết dùng VEMLIDY với tất cả các loại thuốc khác của quý vị có an toàn hay không.

Nhấp vào đây để xem Các Dữ Kiện Quan Trọng về VEMLIDY, bao gồm cả **các cảnh báo quan trọng**.

Vemlidy® tenofovir alafenamide 25mg tablets

Độ an toàn của VEMLIDY đã được nghiên cứu trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng dài hạn và ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe xương và thận được hiểu rõ

An toàn xương

VEMLIDY có tác động đến sức khỏe xương ít hơn so với TDF

Trong Thử Nghiệm 108 và 110, VEMLIDY có tác động ít hơn đến mật độ khoáng xương (BMD) so với TDF.

BMD là thước đo và chỉ số tốt về sức khỏe xương. Đối với những người dùng VEMLIDY trong Thử Nghiệm 108 và 110, sức khỏe xương của họ ít bị ảnh hưởng hơn, và họ có thể duy trì được BMD tốt hơn, so với những người dùng tenofovir disoproxil fumarate (TDF).

Sức khỏe xương rất quan trọng và đối với hầu hết mọi người, xương của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển cho đến độ tuổi 30. Cho dù xương của quý vị vẫn đang phát triển hay quý vị chú trọng hơn vào việc duy trì độ chắc khỏe của xương, VEMLIDY cũng có hiệu quả như TDF mà lại ít ảnh hưởng đến sức khỏe xương hơn.

So với TDF, VEMLIDY có ảnh hưởng ít hơn đến BMD ở thời điểm khoảng 2 năm (96 tuần):

Cột sống thắt lưng

VEMLIDY	TDF
(746 bệnh nhân)	(371 bệnh nhân)
–0.7%	**–2.6%**

Xương hông

VEMLIDY	TDF
(740 bệnh nhân)	(369 bệnh nhân)
–0.3%	**–2.5%**

Số âm càng lớn thì có nghĩa là BMD càng suy giảm nhiều hơn.

BMD là chỉ số quan trọng đánh giá sức khỏe xương. BMD được đo ở những người tham gia nghiên cứu khi họ bước vào cuộc nghiên cứu và đo lại sau khoảng 2 năm kể từ khi cuộc nghiên cứu bắt đầu.

Ý nghĩa lâu dài của những thay đổi này về BMD vẫn chưa được biết.

eGFR = tỷ lệ lọc cầu thận ước tính.

Nhấp vào đây để xem Các Dữ Kiện Quan Trọng về VEMLIDY, bao gồm cả **các cảnh báo quan trọng**.

An toàn thận

VEMLIDY có tác động đến sức khỏe thận ít hơn so với TDF

Trong Thử Nghiệm 108 và 110, những bệnh nhân dùng VEMLIDY gặp ảnh hưởng đến một số xét nghiệm thận ít hơn là những bệnh nhân dùng TDF.

Ở những bệnh nhân dùng VEMLIDY, chức năng thận được duy trì tốt hơn so với những bệnh nhân dùng TDF như đánh giá bằng các xét nghiệm tại phòng thí nghiệm.

Thận giúp quý vị khỏe mạnh bằng cách loại bỏ chất thải ra khỏi máu. Đó là lý do tại sao việc giữ gìn thận lại quan trọng. VEMLIDY có tác dụng tương đương như TDF nhưng ít ảnh hưởng đến thận hơn.

- **VEMLIDY có thể gây ra các vấn đề về thận mới hoặc trầm trọng hơn, bao gồm cả suy thận.** Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị sẽ làm các xét nghiệm máu và nước tiểu để kiểm tra thận của quý vị khi bắt đầu và trong khi điều trị bằng VEMLIDY.
- Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể đề nghị quý vị ngừng dùng VEMLIDY nếu quý vị có các vấn đề mới hoặc trầm trọng hơn về thận.

So với TDF, VEMLIDY có ảnh hưởng ít hơn đến các xét nghiệm chức năng thận trong khoảng thời gian 2 năm (96 tuần):

Thận

VEMLIDY	TDF
–1.2%	**–4.8%**
mL/min eGFR	mL/min eGFR

Số âm càng lớn thì có nghĩa là chức năng thận càng suy giảm.

eGFR là một trong những phép đo mà nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể sử dụng để xem thận của quý vị hoạt động như thế nào. eGFR được đo ở những người tham gia nghiên cứu khi họ bước vào cuộc nghiên cứu và đo lại sau khoảng 2 năm kể từ khi cuộc nghiên cứu bắt đầu.

Ý nghĩa lâu dài của những thay đổi này đối với tần suất gặp các tác dụng phụ ở thận vẫn chưa được biết.

Vemlidy® tenofovir alafenamide 25mg tablets

Cùng một liều thuận tiện, đơn giản hàng ngày với VEMLIDY

VEMLIDY là một viên thuốc nhỏ*, uống cùng thức ăn, bất kỳ thời điểm nào trong ngày mà không cần phải tuân theo lịch trình phức tạp.

Hình ảnh viên thuốc không tương đương kích cỡ thực tế.
(*đường kính 8 mm)

Quý vị phải dùng VEMLIDY theo đúng như chỉ dẫn của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Nếu quý vị đang lọc máu, thì vào các ngày lọc máu, hãy dùng VEMLIDY sau khi lọc máu. Điều quan trọng là quý vị cũng cần phải dùng VEMLIDY theo thời khóa biểu liều lượng đều đặn để tránh bỏ lỡ các liều thuốc.

Đừng ngừng dùng VEMLIDY trừ khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị đề nghị quý vị làm như vậy. Nếu quý vị ngừng dùng thuốc, chứng nhiễm HBV của quý vị có thể trầm trọng hơn (đợt tiến triển cấp nặng). "Đợt tiến triển cấp nặng" là khi chứng nhiễm HBV của quý vị đột ngột quay lại trầm trọng hơn trước đây.

Điều rất quan trọng là quý vị cần mua tiếp thuốc kê toa của quý vị đúng lúc, trước khi hết thuốc. Khi lượng thuốc VEMLIDY của quý vị bắt đầu sắp hết, hãy lấy thêm từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc tiệm thuốc. Việc này sẽ giúp bảo đảm là quý vị không có nguy cơ bỏ lỡ bất kỳ liều thuốc nào và gây đợt tiến triển cấp nặng.

Nếu quý vị dùng quá nhiều VEMLIDY, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc tới ngay phòng cấp cứu bệnh viện nơi gần nhất.

Nhấp vào đây để xem Các Dữ Kiện Quan Trọng về VEMLIDY, bao gồm cả **các cảnh báo quan trọng**.

Quý vị lo lắng về chi phí?

Thấp đến **$0*** tiền đồng trả

Quý vị có thể hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Phiếu Trợ Cấp Tiền Đồng Trả VEMLIDY (VEMLIDY Co-pay Coupon Program)

Chương Trình Phiếu Trợ Cấp Tiền Đồng Trả VEMLIDY là để giúp giảm các khoản chi phí tự trả của quý vị

- Các khoản chi phí tự trả sẽ được đài thọ tới tối đa $6,000 hàng năm
- Không có mức giới hạn hàng tháng
- Dành cho các bệnh nhân hội đủ điều kiện và có bảo hiểm thương mại

Có các dịch vụ thông dịch bằng tiếng Việt.

Vui lòng gọi **1-877-627-0415** ngay hôm nay để bắt đầu.

*Xem các điều khoản và điều kiện cụ thể tại mysupportpath.com

Support Path® luôn sẵn sàng giúp đỡ quý vị, ngay cả khi quý vị không hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Phiếu Trợ Cấp Tiền Đồng Trả VEMLIDY

- Quý vị có cần giúp hiểu về bảo hiểm sức khỏe của quý vị và các chi phí thuốc của Gilead hay không?
- Ngay cả khi quý vị không hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Phiếu Trợ Cấp Tiền Đồng Trả, quý vị có thể gọi Support Path tại số điện thoại dưới đây để tìm hiểu về các nguồn trợ giúp tài chánh khác có thể có sẵn để hỗ trợ trang trải chi phí điều trị và bảo hiểm

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi số **1-855-7-MYPATH** (1-855-769-7284)
Giờ làm việc: Thứ Hai - thứ Sáu, 9 AM đến 8 PM, giờ khu vực miền Đông

Nhấp vào đây **Vui lòng tới trang mạng www.vemlidy.com/savings để biết thêm thông tin về tình trạng hội đủ điều kiện và cách thức ghi danh.**

Vemlidy® tenofovir alafenamide 25mg tablets

VEMLIDY là một loại thuốc theo toa, dùng để điều trị siêu vi viêm gan B (HBV) mãn tính (lâu dài) ở những người lớn mắc bệnh gan ổn định (còn bù).

VEMLIDY có thể gây ra các phản ứng phụ nghiêm trọng, trong đó bao gồm:

- **Chứng nhiễm siêu vi viêm gan B (HBV) trầm trọng hơn.**
  Chứng nhiễm HBV của quý vị có thể trở nên trầm trọng hơn (đợt tiến triển cấp nặng) nếu quý vị dùng VEMLIDY và sau đó ngừng dùng thuốc này. "Đợt tiến triển cấp nặng" là khi chứng nhiễm HBV của quý vị đột ngột quay lại trầm trọng hơn trước đây. Đừng ngừng dùng VEMLIDY khi chưa nói chuyện trước với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị, vì họ sẽ cần giám sát sức khỏe của quý vị thường xuyên để kiểm tra lá gan của quý vị.

Quý vị nên làm gì tiếp theo?

Cho dù quý vị có một toa thuốc hay chỉ vừa mới bắt đầu nghĩ về việc điều trị, điều quan trọng là cần phải biết những việc cần làm tiếp theo.

- **Thường xuyên theo dõi** bệnh viêm gan B của quý vị
- **Hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị** để biết VEMLIDY có thích hợp cho quý vị hay không
- **Dùng VEMLIDY theo chỉ dẫn** của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị

Diễn viên miêu tả.

Truy cập các đường liên kết ở dưới để nghe các câu chuyện của bệnh nhân và tìm hiểu thêm về bệnh viêm gan B

Nhấp vào đây

để xem các video hữu ích từ những bệnh nhân như quý vị

Nhấp vào đây

để xem các nguồn trợ giúp khác

Nhấp vào đây để xem Các Dữ Kiện Quan Trọng về VEMLIDY, cùng với **các cảnh báo quan trọng** về **tình trạng trầm trọng hơn của chứng viêm gan B.**

VEMLIDY, VEMLIDY Logo, SUPPORT PATH, GILEAD và GILEAD Logo là các thương hiệu của Gilead Sciences, Inc., hoặc các công ty liên quan của hãng này.
©2024 Gilead Sciences, Inc. Bảo lưu mọi quyền. US-VEMC-0058 09/24

GILEAD

Vemlidy® tenofovir alafenamide 25mg tablets